

Chek list con Ustione < 6%

- V. periferica;
- C. Vescicale;
- Antidolorifico EV
- (Perfalgan 10mg/kg)
- Medicare con teli bagnati di R. lattato se inviato allo specialista entro 4h.
- Medicare con g. grassa se inviato oltre le 4h.

Se Ustione >6%

2 vene periferiche o CVC


Interossea

NB sulla busta delle urine scrivere sempre:

Luogo, data, ora

A R E A	anni 0	1	5
A. 1/2 della testa	9%	8%	6%
B. 1/2 di una coscia	2 3/4	3%	4
C. 1/2 di una gamba	2%	2%	2 1/4

Percentuale delle superficiali ustionate



La mano del paziente (dita escluse) corrisponde all'1% di S. Corporea. Contare il n. di "mani" ustionate.

Analisi utili da fare in PS e comunicare al C. ustioni:

- Emocromo;
- Azotemia;
- Glicemia
- Elettroliti (Na;K;Ca;Mg;Cl)
- Pt, PTT, Fibrinogeno, ATIII;
- Sgot; SGPT
- Es. urine
- Proteina C reattiva
- Albumine mia
- ECG

Se folgorato:

enzimi cardiaci tutti

Formula di Parkland

(Consensus Formula)

4ml/kg/%TBSA

½ infusa nelle prime 8h

½ nelle rimanenti 16h

Un bambino deve urinare

1ml/kg/h

Se ustione al volto:

Desametasone (soldesam)

0,5mg/kg in due

somministrazioni/die

Numeri telefonici:

Asl RM/C

06/51001

H. S. Eugenio

06/51002628

Centro Ustioni Roma

06/51002202

FAX S. Eugenio

06/5923968

T.I.P. Gemelli

06/30155203

Vademecum sul trattamento dei bambini ustionati.

©A.De Bellis©

www.ustionipediatriche.it

Il presente foglio può essere fotocopiato e distribuito liberamente senza apportarvi alcuna modifica